

BC2B

Esporas de Bacillus Clausii

Jaspharm

HASERPHARM
SERVIMED
MERAKIPHARMA
SERFLOTEX

Equilibra la
flora bacteriana

UN PROBIÓTICO CON CARACTERÍSTICAS ÚNICAS



RESISTENTE A LOS ANTIBIÓTICOS

- » Macrólidos
- » Penicilinas
- » Cefalosporinas
- » Lincomicina
- » Aminoglucósidos
- » Tetraciclinas
- » Rifampicina
- » Cloranfenicol

**Restaura
el equilibrio
de la flora
intestinal**

**Fortalece
el sistema
Digestivo**

**Coadyuva
en los
procesos
diarreicos**

**Refuerza
el sistema
Inmune**

**Contribuye a
la absorción
adecuada
de nutrientes**

1. Guidelines for the Evaluation of Probiotic in Food, 2002.
2. Guarner Fetal. Probiotics and Prebiotics. February 2017, World Gastroenterology Organization Global Guidelines.
3. Who definition, Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including poder milk with live lactic Acid Bacteria, Joint FAO/WHO Expert Consultation, October 2001.
4. Le H. Duc Et al. Characterization of Bacillus Probiotics Available for Human Use. Applied and Environmental microbiology, Apr. 2004, p 2161-2171.
5. Ghelardi E et al. Survival and persistence of Bacillus clausii in the human gastrointestinal tract following oral administration as spore-based probiotic formulation. Journal of Applied Microbiology. 119. 552-559 2015

BC2B

Esporas de Bacillus Clausii



Equilibra la
flora bacteriana

Sin sabor,
sin Lactosa.

Libre de azúcar.

Sin color, sin olor.

Indicado para
adultos y niños.

Fácil administración.



 merakipharma
pasión por la salud

BC2B

Esporas de Bacillus Clausii

2000 millones (2 millardos) / 5 ml

Suspensión Oral No inyectar

Ecuador Reg. San.: 4773-MEE-0719



Jaspharm

RASEPHARM
SERVIMED
MERAKIPHARMIA
SERFLOTEX

BC2B

Esporas de Bacillus Clausii



Equilibra la
flora bacteriana



INDICACIONES

Restaura la flora bacteriana intestinal normal, alterada por la diarrea asociada a infecciones intestinales, intoxicaciones, uso de antibióticos y quimioterápicos.

- Ayuda en el tratamiento de alteraciones digestivas, tales como la diarrea.

**CAJA X 10
AMPOLLAS
BEBIBLES**

POSOLOGÍA

Niños menores de 12 años:
1 ampolla cada 12 horas.

Niños mayores de 12 años y adultos:
3 ampollas al día.